

## DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE DELLE PREPARAZIONE CONSIGLIATA PER PAZIENTI ALLERGICI

Si ritiene opportuno che i pazienti che devono eseguire un esame radiologico con mezzo di contrasto somministrato per via endovenosa e che abbiano una anamnesi per allergia debbano eseguire una preparazione farmacologica prima di sottoporsi all'esame.

La preparazione farmacologica va eseguita in accordo con il proprio medico curante a cui è demandata la prescrizione dei farmaci stessi. Il curante potrà a sua discrezione contattare il Centro Medico per eventuali chiarimenti in merito. Il centro è disponibile per eventuali chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 al numero 0434 640411.

Pazienti nei quali va eseguita la preparazione farmacologica:

- Soggetti con allergia nota al mezzo di contrasto;
- Soggetti con storia di importante reazione allergica dopo esposizione a farmaci, veleno di imenotteri (api, vespe, ecc.), alimenti, ecc.

Per importante reazione allergica si intende la comparsa di anche solo una delle seguenti manifestazioni:

- Respiratorie: broncospasmo, edema alle vie aeree, angioedema, ecc.;
- Cardiovascolari: ipotensione, lipotimia, ecc.;
- Cutanee: reazioni orticarioidi, prurito diffuso, ecc.;
- Gastrointestinali: nausea, vomito, ecc.;
- Soggetti asmatici;
- Soggetti allergici in trattamento continuo o meno per il controllo dei sintomi (es. Allergia al latte, al pelo degli animali, agli acari della polvere, alle graminacee, al nichel, ecc.).

### PREPARAZIONE FARMACOLOGICA

12 ore prima dell'esame	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prednisone (es. Deltacortene): 50 mg</li><li>• Ranitidina (es. Zantac, Ranidil): 150 mg – 1 compressa</li><li>• Cetirizina (es. Zirtec): 10mg – 1 compressa</li></ul>
6 ore prima dell'esame	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prednisone (es. Deltacortene): 50 mg</li></ul>

Nel caso di pazienti intolleranti al cortisone: Trimeton 10 mg – 1 fiala intramuscolo prima dell'esame.

Poiché la maggior parte delle possibili reazioni al mezzo di contrasto tendono a verificarsi nei primi 20 minuti dalla somministrazione dello stesso, si invita il paziente a trattenersi presso il centro medico almeno 30 minuti dalla conclusione dell'esame.

Poiché la Cetirizina (es. Zintec) potrebbe dare sonnolenza, si consiglia inoltre di non utilizzare l'auto od intraprendere altre attività che richiedano un normale livello di attenzione fino a 12 ore dalla assunzione del farmaco.

N.B. si raccomanda di presentarsi all'esame a digiuno da almeno 3 ore.

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Dichiaro di aver preso visione di quanto sopra riportato e di aver avuto la possibilità di chiedere eventuali delucidazioni in merito presso il centro stesso.</li><li>✓ Dichiaro di aver assunto la preparazione sopra consigliata in accordo con il medico di mia fiducia</li></ul> |
|---|

Azzano Decimo, \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_